

Date:

Pression artérielle:

/

B:

Autorisation de traitement avec sédation intraveineuse modérée

1. Je, _____, par la présente consent à recevoir le traitement dentaire suivant: _____
2. Le traitement sera effectué par le Dr. Olivier Julien. J'autorise ce dernier à demander assistance à un de ses collègues ou médecin s'il le jugeait nécessaire.
3. Les risques-bénéfices, effets escomptés, effets secondaires ainsi que les options alternatives du traitement proposé m'ont été expliqués par le Dr Olivier Julien et je confirme que j'ai bien compris les explications.
4. J'ai eu l'opportunité de poser des questions et celles-ci ont été répondues clairement.
5. Je consens également à tout traitement additionnel ou traitement alternatif que le Dr. Olivier Julien jugerait nécessaire dans l'immédiat lors de la réalisation du traitement proposé, lequel consentement étant impossible à obtenir lorsque je serai sous les effets de la sédation intraveineuse modérée.
6. J'ai eu l'occasion de discuter avec mon dentiste de mon état de santé, de mes allergies, mes médicaments et de tout autre problème de nature médicale.
7. Pour les femmes: je comprends que je ne dois pas être enceinte pour recevoir une sédation intra-veineuse, tout médicament ayant le pouvoir d'affecter le fœtus. J'ai eu l'occasion d'aviser le Dr. Olivier Julien advenant le cas où je penserais être enceinte, pour que mon rendez-vous soit reporté ou que l'on discute d'une autre approche thérapeutique.
8. J'affirme que je lis et écris couramment le français. **Mon accompagnateur demeurera dans la salle d'attente de la clinique dentaire et me conduira à la maison après mon rendez-vous.** Mon accompagnateur devra demeurer avec moi en permanence jusqu'à ce que les effets de la sédation disparaissent et que je sois apte à m'occuper de moi-même. Je comprends que mon jugement et ma coordination seront altérés pour les 24 prochaines heures après ce traitement. J'accepte de ne pas conduire ni opérer de la machinerie lourde pour 24 heures, et même plus, si les effets de la sédation persistent.

SIGNATURE

DATE

TÉMOIN

ADULTE ACCOMPAGNATEUR

TÉLÉPHONE

Instructions pour sédation intraveineuse

Svp prendre connaissance du document ci-joint, en entier, pendant la semaine précédant votre rendez-vous.

Avant la sédation:

1. Vous devez être à jeun au moins 8 heures avant le rendez-vous
2. Dans un monde idéal, **il est fortement recommandé de ne pas fumer (tabac, vapoteuse, cannabis et ses dérivés) pour 5 à 10 jours avant** votre rendez-vous de sédation intraveineuse puisque l'utilisation de ces substances diminue l'efficacité de la médication utilisée pour votre sédation.
3. Liquides clairs sont permis jusqu'à 2 heures avant le rendez-vous (eau, jus de fruits sans pulpe, thé pâle, café noir, aucun alcool) Si vous ne pouvez voir le fond de votre tasse, ne le buvez pas...
4. Ne rien avaler dans les 2 heures précédant votre chirurgie (sauf vos médicaments réguliers si nécessaire) Il est rare que les médicaments qui seront utilisés pour votre sédation causent des nausées. C'est pourquoi il est si important d'arriver à votre rendez-vous l'estomac vide et ainsi éviter des complications dangereuses.
5. Portez des vêtements amples, confortables, ainsi qu'un gilet ou T-shirt à manches courtes. vous pourriez vous sentir étourdi après votre sédation; souliers plats et confortables sont de mise...
6. Svp nous aviser de tout changement à votre état de santé (fièvre, malaise, problème de santé, symptômes de gastro) le plus tôt possible avant votre rendez-vous.
7. Un adulte responsable doit prendre soin de vous avant et après votre rendez-vous. Cet adulte accompagnateur doit absolument demeurer avec vous tant et aussi longtemps que vous êtes sous l'effet de la médication.
8. Vous devrez effectuer votre paiement et avoir vos documents signés avant le rendez-vous.
9. Svp enlever vos verres de contact avant le rendez-vous.
10. Veuillez enlever tout vernis à ongles/faux ongles puisque ces derniers peuvent interférer avec nos équipements médicaux.
11. Si vous pensez être enceinte; il n'est pas conseillé d'utiliser la sédation intraveineuse. Ces médicaments, sécuritaires, peuvent poser un risque pour la santé du fœtus. Vous devez nous informer si vous pensez être enceinte pour que nous puissions reporter votre rendez-vous ou modifier votre plan de traitement

Pendant la sédation:

1. Nous aurons besoin d'avoir accès à vos bras et doigts pour raccorder nos équipements médicaux qui mesureront votre pression artérielle, votre pouls, votre saturation en oxygène en tout temps pendant votre sédation.
2. Nous utiliserons le dos de votre main ou l'intérieur du coude à titre de site d'injection pour la sédation intraveineuse.
3. Il ne s'agit pas d'anesthésie générale: vous ne perdrez pas conscience. Vous serez capable de communiquer avec votre dentiste et vous serez capable de répondre aux instructions pendant votre rendez-vous.

Même s'il ne s'agit pas d'anesthésie générale, la sédation intra-veineuse vous permet d'être confortable et très détendu, vous pourriez même dormir un peu pendant le rendez-vous. Plusieurs patients se souviennent très peu des détails de leur rendez-vous une fois de retour à la maison. Une feuille d'instructions à respecter vous sera remise suite à votre intervention pour faciliter votre remise sur pied.

Après la sédation:

1. Vous devez être raccompagné à la maison par un adulte responsable. Vous ne pouvez pas prendre l'autobus ou le taxi, à moins que votre accompagnateur ne fasse également partie du voyage. Il est obligatoire que cet accompagnateur demeure avec vous jusqu'à ce que les effets de la sédation aient complètement disparus et que vous soyez apte à vous occuper de vous-même sans aide.
2. Il vous sera peut-être donné une prescription suite à votre rendez-vous. Svp vous assurer que la personne qui vous accompagne puisse remplir cette prescription pour vous.
3. Pour 24 heures suivant la sédation, vous ne pouvez pas conduire, opérer de la machinerie lourde, prendre des décisions importantes, boire de l'alcool ou prendre des somnifères. Cette période peut être prolongée si les effets de la sédation semblent persister plus longtemps.
4. S'hydrater abondamment. (Pas d'alcool pour 24 heures) Vous pouvez manger un repas léger après votre rendez-vous. Il est important de manger avant de prendre les médicaments prescrits.
5. Une irritation, un ecchymose (bleu), une douleur au site d'injection est parfaitement normale suite à votre sédation intraveineuse. Appliquez des compresses froides et chaudes en alternance pour réduire l'inconfort. Svp nous aviser de toute douleur ou enflure excessive à votre site d'injection.

La sédation intraveineuse est une technique couramment utilisée pour contrôler l'anxiété en dentisterie. L'utilisation de la sédation vous permettra d'aller de l'avant

dans votre plan de traitement dentaire préalablement établi avec votre dentiste et ainsi bénéficier d'une meilleure santé dentaire.

Instructions suite à votre sédation intraveineuse

1. Vous devez être accompagné à la maison par un adulte responsable. Vous ne pouvez pas prendre l'autobus ou un taxi, à moins que l'adulte responsable ne vous accompagne lors de votre trajet. Cet adulte responsable devra demeurer à vos côtés pour toute la journée ou jusqu'à ce que les effets de la sédation ne soient complètement disparus.
2. Il se peut qu'une prescription vous soit remise lors de votre rendez-vous. Assurez-vous que votre accompagnateur puisse remplir cette prescription pour vous.
3. Pour les 24 prochaines heures, il vous sera impossible de conduire, de conduire de la machinerie lourde, de prendre des décisions importantes, de prendre de l'alcool, ou de prendre des somnifères. Cette période pourrait être prolongée si vous sentez que les symptômes de la sédation persistent.
4. Buvez beaucoup de liquide (sans alcool) suite à votre rendez-vous. Vous pouvez également prendre un repas léger immédiatement après votre sédation. Vous devez manger avant de prendre les médicaments prescrits.
5. Vous pourriez avoir une ecchymose (bleu) ou une douleur, une irritation, au site d'injection dans votre bras ou votre main. Vous pouvez appliquer, en alternance, des compresses chaudes et froides au site d'injection pour diminuer l'inconfort. Veuillez nous aviser dès que possible si vous présentez une douleur ou une enflure importante.

:

DR LUC DUCHARME  & ASSOCIATES

Pour toute question au sujet de votre sédation, veuillez contacter **Dr Sacha Singh**
au **613-614-0215**

Pour toute autre question veuillez nous contacter au **613-749-1785**.